

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



# SUPRALID

INSECTICIDA BIOQUÍMICO – ALCALOIDE, ALQUILSULFATO  
ARGEMONINA, BERBERINA, RICININA,  $\alpha$ -TERTHIENIL

Composición química:	p/v
(6S,12S)-2,3,8,9-tetramethoxy-13-methyl-13-azadibenzo[b,f] bicyclo[3.3.1]nona-2,6-diene	3,50 %
7,8,13,13a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-[methylenebis(oxy)]berbinium	2,20 %
1,2-dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile	2,80 %
2,5-di(thiophen-2-yl)thiophen	3,50 %
Ingredientes inertes	88,00 %
Total	100,00 %

Contiene: 120 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto: ( ) 50mL ( ) 100mL ( ) 250mL ( ) 500mL

## PRECAUCIÓN

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO  
Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

Ultraquimia Agrícola, S.A de C.V.  
Calle 56 Sur, N 7 A (Esq. Andador 11)  
Col. CIVAC, 62500 Jiutepec, Morelos. Tel. (777) 3211477



PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	357-197	01/04/2014
HONDURAS	1163-413-III	15/12/2016
PANAMÁ	5554c	21/07/2011

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:



¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



# SUPRALID

INSECTICIDA BIOQUÍMICO – ALCALOIDE, ALQUILSULFATO  
ARGEMONINA, BERBERINA, RICININA,  $\alpha$ -TERTHIENIL

## Composición química:

	p/v
(6S,12S)-2,3,8,9-tetramethoxy-13-methyl-13-azadibenzo[b,f]bicyclo[3.3.1]nona-2,6-diene].....	3,50 %
7,8,13,13a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-[methylenebis(oxy)]berbinium .....	2,20 %
1,2-dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile .....	2,80 %
2,5-di(thiophen-2-yl)thiophen.....	3,50 %
Ingredientes inertes.....	88,00 %
Total.....	100,00 %

Contiene: 120 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

**Contenido neto: ( )3.785L ( )5L ( )10L**

## PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

### FORMULADOR:

Ultraquimia Agrícola, S.A de C.V.

Calle 56 Sur, N 7 A (Esq. Andador 11) Col. CIVAC, 62500 Jiutepec, Morelos. Tel. (777) 3211477



### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, MASCARILLA, LENTES, GUANTES DE HULE, DOSIFICADOR Y APLICADOR.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.  
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO  
Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

SUPRALID es un insecticida bioquímico derivado de extractos vegetales que no tienen efectos nocivos en la salud. Sin embargo, si el producto es ingerido en grandes cantidades puede causar dolor de cabeza, náusea y diarrea. La exposición prolongada o repetida puede causar irritación en la piel, ojos y membranas mucosas.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Busque atención médica si la persona tiene reacciones adversas y muéstrele la etiqueta. No induzca el vómito.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Lave el área afectada con abundante agua y jabón. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volverla a utilizar.


**POR INHALACIÓN:** Si se produce dificultad en respirar, traslade a la persona afectada al aire fresco. Busque atención médica de inmediato.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Debe lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico si la irritación persiste.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS  
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

### TRATAMIENTO MÉDICO:

No requiere de antídoto ni tratamiento específico. El tratamiento debe ser sintomático.



**CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS  
ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS,  
CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.  
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON  
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**



**AVISO DE GARANTIA:**

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta, no teniendo control en la aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso. El formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

<b>PAÍS</b>	<b>NÚMERO DE REGISTRO</b>	<b>FECHA DE REGISTRO</b>
<b>GUATEMALA</b>	357-197	01/04/2014
<b>HONDURAS</b>	1163-413-III	15/12/2016
<b>PANAMÁ</b>	5554c	21/07/2011

**NÚMERO DE LOTE:**

**FECHA DE FORMULACIÓN:**

**FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:**



¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:  
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL  
MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA  
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y  
APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, MASCARILLA,  
LENTES, GUANTES DE HULE, DOSIFICADOR Y  
APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO  
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.  
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO  
Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO

#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

**SUPRALID** es un insecticida bioquímico derivado de extractos vegetales que no tienen efectos nocivos en la salud. Sin embargo, si el producto es ingerido en grandes cantidades puede causar dolor de cabeza, náusea y diarrea. La exposición prolongada o repetida puede causar irritación en la piel, ojos y membranas mucosas.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Busque atención médica si la persona tiene reacciones adversas y muéstrela la etiqueta. No induzca el vómito.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Lave el área afectada con abundante agua y jabón. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volverla a utilizar.

**POR INHALACIÓN:** Si se produce dificultad en respirar, traslade a la persona afectada al aire fresco. Busque atención médica de inmediato.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Debe lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico si la irritación persiste.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS  
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

#### TRATAMIENTO MÉDICO:

No requiere de antídoto ni tratamiento específico. El tratamiento debe ser sintomático.

DISAGRO

# SUPRALID

INSECTICIDA BIOQUÍMICO – ALCALOIDE, ALQUILSULFATO  
ARGEMONINA, BERBERINA, RICININA, α-TERTHINIENIL

#### Composición química:

	p/v
(6S,12S)-2,3,8,9-tetramethoxy-13-methyl-13-azadibenzo[b,f]	3.50 %
bicyclo[3.3.1]nona-2,6-diene	2.20 %
7,8,13,13a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-[methylenebis(oxy)]berberinium	2.80 %
1,2-dihydro-4-methoxy-1-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile	3.50 %
2,5-di(thiophen-2-yl)thiophen	3.50 %
Ingredientes inertes	88.00 %
Total	100.00 %

Contiene: 120 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Contenido neto: ( )1L ( )20L ( )25L ( )50L ( )200L  
( )210L ( )1000L

## PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

#### FORMULADOR:

Ultraquimia Agrícola, S.A de C.V.  
Calle 56 Sur, N 7 A (Esq. Andador 11)  
Col. CIVAC, 62500 Jiutepec, Morelos,  
México. Tel. (777) 3211477



CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS  
ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS  
AGRÍCOLAS,  
CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL  
PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.  
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON  
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



#### AVISO DE GARANTIA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta, no teniendo control en la aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso. El formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	357-197	01/04/2014
HONDURAS	1163-413-III	15/12/2016
PANAMÁ	5554c	21/07/2011

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO:



[Signature]

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**SUPRALID®** es un producto biodegradable, por su condición orgánica y mineral el producto no es tóxico ni contaminante para el medio ambiente. Durante su manejo evite verter el producto en ríos, lagos, lagunas y otras fuentes de agua.

#### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

No dejar sobrantes en el equipo de aplicación durante ningún período de tiempo. No utilice los envases vacíos para otros propósitos. No tirar los residuos por el drenaje, elimínese los residuos del producto y sus recipientes como residuos peligrosos y con todas las precauciones posibles. Realice triple lavado a los envases vacíos y utilice este lavado durante la aplicación del producto, posteriormente los envases vacíos deben destruirse perforándolos y entregarse al centro de acopio más cercano. Prohibido disponer de remanentes o empaques vacíos de **SUPRALID®** en vertederos, botaderos y/o rellenos sanitarios autorizados o ilegales. En caso de derrame prevenir la contaminación del agua o alimentos. Si se trata de un derrame de solución o mezcla del producto, cubrir con arena, aserrín u otro material absorbente inerte y recoger el producto absorbido. Si se trata de un derrame de producto sólido, recoger con una pala y si es posible, recuperar el producto para su uso. Colocar el recolectado no utilizable dentro de un recipiente hermético identificado para su posterior eliminación de acorde a las regulaciones locales.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

#### AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control en la aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso. El formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

#### FORMULADOR:

Ultraquímica Agrícola, S.A de C.V.  
Calle 56 Sur, N 7 A (Esq. Andador 11)  
Col. CIVAC, 62500 Jiutepec, Morelos,  
México. Tel. (777) 3211477



#### IMPORTADOR:

GUATEMALA  
QUILUBRISA - km 36.5 Carretera al Pacífico, Palín, Escuintla,  
Guatemala, C.A. Teléfonos: + 502 7771 9800

#### GUATEMALA

DISAGRO DE GUATEMALA, S.A. - Anillo Periférico 17-36 zona  
11, Guatemala, Guatemala, C.A. Teléfono: + 502 2474 9300

#### HONDURAS

FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. - Boulevard del Norte,  
borde derecho de Río Blanco, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel.: + 504 2551 3070/71

PAÍS  
GUATEMALA  
HONDURAS

NÚMERO DE REGISTRO  
357-197  
1163-413-III

FECHA DE REGISTRO  
01/04/2014  
15/12/2016



¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

# SUPRALID®

**INSECTICIDA BIOQUÍMICO – ALCALOIDE, ALQUILSULFATO  
ARGEMONINA, BERBERINA, RICININA, α-TERTHIENIL**

## PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,02 g/mL a 25°C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O  
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR  
EXPOSICIÓN.**

**"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN."  
"MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE  
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS."**



#### USO AGRONÓMICO

#### MODO DE ACCIÓN:

**SUPRALID®** es un insecticida bioquímico que ejerce su acción por contacto e ingestión a través de un grupo de componentes orgánicos con diferentes modos de acción, siendo difícil que los insectos logren eliminarlo de su cuerpo o escapen. **SUPRALID®** traspasa fácilmente la cutícula de los insectos afectando el sistema nervioso central y periférico, ocasionando convulsiones, tetanización de músculos y muerte del insecto.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Al aplicar **SUPRALID®** debe asegurarse que el equipo esté en condiciones adecuadas de uso, sin fugas y debidamente calibrado con agua. Utilice el equipo de protección adecuado al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación como: botas y guantes de hule, mascarilla, lentes, dosificador y aplicador. Procure que el producto tenga contacto con los insectos inmaduros o adultos presentes. El tamaño de gota y presión de aspersión deben permitir la cobertura de los sitios donde se localizan las plagas. Después de aplicar el producto se recomienda lavar con suficiente agua y jabón el equipo de aplicación.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 6.5 a 7.5. Vierta la cantidad necesaria de SUPRALID® directamente con la cantidad de agua requerida, siempre en primer orden de adición a los otros insumos que tendrá la mezcla. Para obtener una mayor calidad en la aplicación es recomendable adicionar a la mezcla un surfactante penetrante a base de silicón.



**RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Aguacate <i>Persea americana</i> Naranja <i>Citrus sinensis</i> Limón <i>Citrus limon</i>	Araña roja <i>Oligonychus punicae</i>	3.0 L/ha (2.1 L/mz)	Volumen de aplicación 1500-2000 L/ha. Para asegurar un adecuado control, es necesario aplicar un coadyuvante no iónico
Cebolla <i>Allium cepa</i> Cebollín <i>Allium fistulosum</i> Ajo <i>Allium sativum</i> Espárrago <i>Asparagus officinalis</i> Arveja china y dulce <i>Pisum sativum</i> Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i>	Trips <i>Thrips tabaci</i>	1.5 – 2 L/ha (0.7 – 1.4 L/mz)	Para asegurar un control adecuado es necesario agregar a la mezcla un coadyuvante a razón de 0.6 mL/L de agua; volumen de agua 450 L de agua/ha.
Fresa <i>Fragaria Vesca</i> Frambuesa <i>Rubus idaeus</i> Mora <i>Rubus ulmifolius</i>	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i> Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	2.0 – 3.0 L/ha (1.4 – 2.1 L/mz)	Volumen de aplicación 600 L de agua/ha
Brócoli <i>Brassica oleracea var. italica</i> Repollo <i>Brassica oleracea var. capitata</i> Col de bruselas <i>Brassica oleracea var. gemmifera</i> Coliflor <i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	Palomilla dorso de diamante <i>Plutella xylostella</i> Gusano falso medidor <i>Trichoplusia ni</i>	3.0 L/ha (2.1 L/mz)	Agregar coadyuvante a la mezcla. Volumen de aplicación 450 – 550 L de agua/ha.
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Chile pimiento <i>Capsicum annuum</i> Chile habanero <i>Capsicum chinense</i> Chile jalapeño <i>Capsicum annuum var. glabrusculum</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	1.5 – 2 L/ha (0.7 – 1.4 L/mz)	Aplicación al follaje.
Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i> Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>		
Papaya <i>Carica papaya</i>	Ácaros <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Polyphagotarsonemus latus</i> Áfidos <i>Myzus persicae</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>		
Okra <i>Abelmoschus esculentus L</i>	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips palmi</i>	Para aplicación en campo: 2.0 – 2.4 L/ha (1.12 – 1.68 L/mz)  Para aplicación post-cosecha: 1 cc/L de agua	Se recomienda para aplicación en campo y post-cosecha. Para las aplicaciones en campo, realizar la aplicación vía foliar y dirigida a las flores, cuando aparezcan los primeros estadios de la plaga. Se recomienda utilizar en conjunto con el coadyuvante Disawett Max, en la dosis recomendada, para mejorar la cobertura y penetración del producto.



**INTERVALO DE APLICACIÓN:**

SUPRALID® puede aplicarse durante todo el ciclo del cultivo: en floración, durante la polinización, fructificación y cortes. Se recomienda realizar las aplicaciones al observar las primeras oviposturas o al detectar las primeras infestaciones, de preferencia durante los primeros instares larvarios o ninfales que son más susceptibles. En limón persa realice aplicaciones a intervalos máximos de 21 días. Aplique en brotes recién emergidos, continúe aplicando durante el crecimiento del brote y en floración; así mismo, al inicio, durante y al término del crecimiento del fruto, ya que estas son las etapas fenológicas cuando se presentan los insectos plaga.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:**

0 días.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:**

Inmediatamente después que seque el rocío de la aplicación.

**FITOTOXICIDAD:**

SUPRALID® no es fitotóxico a los cultivos indicados si es aplicado de acuerdo a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:**

No mezcle SUPRALID® con fungicidas cúpricos, azufrados e hidróxido de calcio. Es compatible con aceites, jabones, extractos vegetales y productos microbianos, todos dentro del rango de pH 6.5 a 7.5. Para mezclas que se realicen con otros productos se recomienda utilizar aquellos que estén autorizados para los cultivos indicados anteriormente, realizando una prueba de compatibilidad previa a la aplicación.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

SUPRALID® deberá ser almacenado y transportado en su envase original, etiquetado, en un lugar ventilado y bajo llave, alejado de los niños y animales domésticos, no transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa o utensilios de uso personal. Evite derrames y si éstos ocurren cubriros con aserrín o tierra.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN  
DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

SUPRALID® es un insecticida bioquímico derivado de extractos vegetales que no tienen efectos nocivos en la salud. Sin embargo, si el producto es ingerido en grandes cantidades puede causar dolor de cabeza, náusea y diarrea. La exposición prolongada o repetida puede causar irritación en la piel, ojos y membranas mucosas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Busque atención médica si la persona tiene reacciones adversas y muéstrele la etiqueta. No induzca el vómito.

**POR INHALACIÓN:** Si se produce dificultad para respirar, traslade a la persona afectada al aire fresco. Busque atención médica de inmediato.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Debe lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico si la irritación persiste.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Lave el área afectada con abundante agua y jabón. Retire la ropa contaminada y lávela antes de volverla a utilizar.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A  
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No requiere de antídoto ni tratamiento específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

PAÍS  
Guatemala  
Honduras

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  
Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)  
Hospital Escuela

TELÉFONOS  
(502) 2251-3560 / 2232-0735  
(506) 2223-1028

AG - SENASA  
CENTRO REGULADOR DE INSUMOS AGRICOLAS  
APROBACION DE ETIQUETAS  
FECHA: 28/10/2025  
FIRMA: [Signature]