

TANDEM 40 SC

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

AZOXYSTROBIN 20% + FLUTRIAFOL 20%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ESTROBILURINA, TRIAZOL
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC	Azoxystrobin: 11 Flutriafol: 3

MODO DE ACCIÓN

TANDEM® 40 SC es un fungicida de amplio espectro con efecto preventivo curativo y erradicante. Posee acción por contacto, translaminar y sistémica. Azoxystrobin impide la germinación de esporas y la respiración mitocondrial de los hongos. Flutriafol inhibe la síntesis de ergosterol, que impide el crecimiento del hongo. **TANDEM® 40 SC** actúa sobre la cadena de transferencia de electrones entre los citocromos b y c1 bloqueando la síntesis de ATP.

USOS PARA NICARAGUA:

USOS		
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Tizón temprano <i>Alternaria sp.</i> Manchado del grano <i>Helminthosporium oryzae</i> <i>Rhizoctonia solani</i> Pudrición de la vaina <i>Sarocladium oryzae</i>	0.3 – 0.5 L/ha (0.21 – 0.35 L/mz)
Maní <i>Arachis hypogae</i>	Tizón temprano <i>Alternaria sp.</i> Mancha foliar temprana <i>Cercospora arachidicola</i> Mancha corchosa <i>Leptosphaerulina crassiasca</i> <i>Rhizoctonia solani</i>	0.4 – 0.5L/ha (0.28 0.35L/mz)

PRESENTACIONES

1L,5L, 250ML, 500ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.