

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.
NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

No dejar sobrantes en el equipo de aplicación durante ningún período de tiempo. No utilice los envases vacíos para otros propósitos. No tirar los residuos por el drenaje, elimínese los residuos del producto y sus recipientes como residuos peligrosos y con todas las precauciones posibles. Realice triple lavado a los envases vacíos y utilice este lavado durante la aplicación del producto, posteriormente los envases vacíos deben destruirse perforándolos y entregarse al centro de acopio más cercano. Prohibido disponer de remanentes o envases vacíos de **SPLIT® 18.3 SE** en vertederos, botaderos y/o rellenos sanitarios autorizados o ilegales. En caso de derrame prevenir la contaminación del agua o alimentos. Si se trata de un derrame de solución o mezcla del producto, cubrir con arena, aserrín u otro material absorbente inerte y recoger el producto absorbido. Colocar el recolectado no utilizable dentro de un recipiente hermético identificado para su posterior eliminación de acorde a las regulaciones locales.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta, no teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso. El formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

FORMULADO POR: HANGZHOU UDRAGON CHEMICAL CO., LTD.

172 Zhangjiadun Road, Tangxi Industrial Development Zone,
Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, China.
Teléfono: 0571-86379188 Email: reg@udragon.cn

IMPORTADOR:

GUATEMALA
QUILIBRISA - km 36.5 Carretera al Pacífico,
Palín, Escuintla, Guatemala, C.A.
Teléfonos: + 502 7771 9800

GUATEMALA
DISAGRO DE GUATEMALA, S.A. - Anillo
Periférico 17-36 zona 11, Guatemala,
Guatemala, C.A.
Teléfono: + 502 2474 9300

EL SALVADOR
UNIFERSA DISAGRO, S.A. DE C.V.
Kilómetro 82.5, Carretera a Sonsonate -
Acajuta, PLANTA DISAGRO A1,
Departamento de Sonsonate, El Salvador.
Teléfono: + 503 2241 5900

PANAMÁ
ABONOS DEL PACÍFICO, S.A.
El Cabrero, Villa Universitaria, David, Panamá
Teléfonos: +507 7774142

PAÍS
NICARAGUA

HONDURAS
FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V. -
Boulevard del Norte, borde derecho de Río
Bianco, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: + 504 2551 3070/71

NICARAGUA
SAGSA DISAGRO, S.A. - Paso desnivel
Portezuelo 300 metros Norte, Managua,
Nicaragua, C.A.
Tel.: + 505 2249 1640

COSTA RICA
ABONOS DEL PACÍFICO, S.A. (ABOPAC) - Del
Centro Empresarial 2.5 kilómetros Oeste sobre la
autopista a Ciudad Colón
Tel.: + 506 2205 1000

NÚMERO DE REGISTRO
DSG-43A-2020

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.


SPLIT® 18.3 SE

**FUNGICIDA – ESTROBILURINA, TRIAZOL
PYRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOLE**

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,08 g/mL a 20°C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS
CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO:

Fungicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

SPLIT® 18.3 SE es un fungicida sistémico que combina la acción preventiva y curativa del Pyraclostrobin con el efecto protectante y erradicante del Epoxiconazole. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada impidiendo la formación de energía al inhibir la respiración mitocondrial interrumpiendo el transporte de electrones, lo cual resulta en la cesación del crecimiento del hongo. Así mismo, inhibe la biosíntesis del ergosterol de los hongos ascomicetes y basidiomicetes. La acción curativa erradicante de **SPLIT® 18.3 SE** provoca la desintegración de las cadenas de esporas, inhibiendo consistentemente la esporulación.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Es posible aplicar **SPLIT® 18.3 SE** con equipo terrestre, utilizando equipo de aspersión convencional: bomba de mochila manual o motorizada y aspersoras tractorizadas. Asegúrese que el equipo se encuentre limpio, en buenas condiciones y sin fugas antes de su uso. Antes de aplicar **SPLIT® 18.3 SE** calibre el equipo con agua para garantizar que se está aplicando la dosis correcta. Se recomienda utilizar una boquilla cónica.

Utilice equipo de protección personal durante la aplicación: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga y delantal de material impermeable.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Durante la preparación de la mezcla se recomienda utilizar agua con pH 5 a 6.5. Utilizar el siguiente equipo auxiliar y de protección: botas de hule, guantes, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga, delantal de material impermeable, dosificador y aplicador.

Llene el tanque de aspersión con la mitad de agua requerida, agregue la dosis recomendada de **SPLIT® 18.3 SE**, agite continuamente y complete el volumen de mezcla agregando lentamente el agua restante. Continúe agitando y asegúrese de obtener una mezcla homogénea. El equipo y utensilios empleados en la mezcla y aplicación, deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo y se les debe proporcionar el mantenimiento necesario.



RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos para Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya <i>Hemileia vastatrix</i>	0.4 L/ha (0.28 L/mz)	Aplicar al inicio de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. No aplique cuando las temperaturas sean altas (mayores a 28 °C) ya que puede producir daños. Se recomienda hacer las aplicaciones durante la mañana o tarde, evite hacer aplicaciones con vientos mayores a 15 km/h. Antes de realizar la aplicación, debe observarse que la superficie de las hojas esté seca, hojas con rocío o lluvia no garantizan la adherencia del caldo fungicida.
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Roya naranja <i>Puccinia kuennii</i>	0.4 L/ha (0.28 L/mz)	
Maní <i>Arachis hypogaea</i>	Roya del maní <i>Puccinia arachidis</i> Mancha corchosa <i>Leptosphaerulina crassiasca</i> Viruela temprana <i>Cercospora arachidicola</i> Viruela tardía <i>Cercosporidium personatum</i>	0.45 L/ha (0.32 L/mz)	

Cultivos para Nicaragua:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Maní <i>Arachis hypogaea</i>	Roya del maní <i>Puccinia arachidis</i> Mancha corchosa <i>Leptosphaerulina crassiasca</i> Viruela temprana <i>Cercospora arachidicola</i> Viruela tardía del maní <i>Cercosporidium personatum</i>	0.7 - 1.0 L/ha (0.49 - 0.7 L/mz)

Se recomienda utilizar un volumen de agua de 200 - 400 L/ha (150 - 300 L/mz) para aplicaciones terrestres, variando la dosis según el cultivo.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Maní: aplicar preventivamente. En intervalos de 21 – 28 días según las condiciones climáticas y presión de las enfermedades.
Café: iniciar las aplicaciones con la presencia de un bajo inoculo residual. Entre 35 y 50 días, según sea la presión de la enfermedad. Aplicar preventivamente.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Maní: 14 días
Café: 45 días

En caso de cultivos de exportación, respetar intervalos acorde a exigencias del país destino.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas.

FITOTOXICIDAD:

SPLIT® 18.3 SE no causa fitotoxicidad si se aplica en las dosis y usos recomendados.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con productos de reacción alcalina, sin embargo, puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad a pequeña escala antes de aplicar el producto en mezclas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios. Almacenar bajo llave fuera del alcance de los niños y personal no autorizado, en un lugar fresco, seco y aireado. Mantener alejado del calor y evitar el contacto directo con la luz solar. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente cuando no esté en uso. Evite derrames y si éstos ocurren cubrir con arena u otro material absorbente inerte.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede causar irritación leve de los ojos y moderada de la piel. En caso de inhalación, puede causar irritación de las membranas mucosas. Otros síntomas incluyen incoordinación muscular, temblor, dificultad para respirar y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento debe ser sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)	(502) 2251-3560 / 2232-0735
El Salvador	Hospital Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322 / 2232-2415
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 Ext. 1294 Cel: 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET)	(507) 523-4948

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

SPLIT®18.3 SE es persistente en suelo.

PELIGROS FÍSICO-QUÍMICOS: no corrosivo ni inflamable. En condiciones normales de almacenamiento, el producto no se considera combustible ni con riesgo de explosión.