

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y
A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Antracol 70 WP, es un fungicida
protectante de acción multi-sitio que inhibe la germinación
de esporas y con ello evita el desarrollo del hongo.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Utilizar equipo de aspersión
manual de espalda, motorizado ó aéreo. Verifique que el
equipo utilizado esté en buen estado de funcionamiento y
debidamente calibrado. Para aplicar este producto se
recomienda usar boquilla de **CONO**. Para aplicación aérea
usar boquillas con ángulo deflector. En aplicación aérea
dejar un borde de 100 metros con casas de habitación y
cuerpos de agua. Además deben de seguirse las indicaciones
dadas en la regulación vigente en el país para las actividades
de aviación agrícola.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para mezcla en emulsión agua/aceite:

1. Agregar el aceite necesario y agitar por cinco minutos.
2. Agregue el emulsificante al 1% de la cantidad del aceite y agite por cinco minutos.
3. Agregue el 50% de la cantidad de agua y agite por cinco minutos.
4. Agregue la dosis de **Antracol 70 WP** recomendada y agite por cinco minutos más.
5. Agregar la cantidad restante de agua y agite por cinco minutos.

Para mezcla en agua (sin aceite):

1. Agregar toda el agua y agitar por cinco minutos.
2. Agregar adherente y agitar por cinco minutos.
3. Agregar la dosis de **Antracol 70 WP** recomendada y agitar por cinco minutos.

Utilizar un volumen de mezcla para aplicación aérea de 18-30 l/ha (12,6 – 21,0 l/mz) y de 80-200 l/ha (56-140 l/mz) para aplicaciones terrestres. Se recomienda tener a mano paleta de agitación, cubetas, toneles y cepillos. Lavar el equipo al terminar la aplicación: cubetas, paletas de agitación, cepillo, etc.



RECOMENDACIONES DE USO: Usos recomendados para: Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana y Belice.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Banano y Plátano	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	1,0 – 2,0 kg/ha (0,7-1,4 kg/mz)
Café <i>Coffea arabica</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp. Mancha Cercospora <i>Cercospora</i> spp.	1,5-2,5 kg/ha (1,0-1,75 kg/mz)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Helminthosporiosis <i>Helminthosporium oryzae</i>	
Papa <i>Solanum tuberosum</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Chile <i>Capsicum annum</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i>	Mancha foliar gris <i>Septoria lycopersici</i> Mancha de la hoja <i>Stemphyllium solani</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	

Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i>
Ajo <i>Allium sativum</i>	Argeño de la cebolla-ajo <i>Alternaria porri</i>
Cebolla <i>Allium cepa</i>	
Manzana <i>Malus</i> spp.	Roña de la manzana <i>Venturia inaequalis</i>
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Roya del frijol <i>Uromyces phaseoli</i>
Ornamentales	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp.
Melón <i>Cucumis melo</i> Papino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Calabaza <i>Cucurbita</i> sp.	Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i>

USO AUTORIZADO EN NICARAGUA:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	<i>Cercospora</i> spp.	1,5-2,0 kg/ha
Arroz <i>Oryza sativa</i>	<i>Phytophthora infestans</i>	
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>		
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Pyricularia oryzae</i>	
Cebolla <i>Allium cepa</i>	<i>Colletotrichum</i> spp.	
Melón <i>Cucumis melo</i>		
Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	<i>Peronospora tabacina</i>	
Cítricos <i>Citrus</i> sp.		

USO AUTORIZADO EN COSTA RICA:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Banano <i>Musa</i> spp.	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	1,0-2,0 kg/ha
Café <i>Coffea arabica</i>	Mancha Cercospora <i>Cercospora coffeicola</i>	
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mancha foliar gris <i>Septoria lycopersici</i> Mancha de la hoja <i>Stemphyllium solani</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	1,5-2,5 kg/ha
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i>	
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Argemón de la cebolla-ajo <i>Alternaria porri</i>	
Manzana <i>Malus</i> spp.	Roña de la manzana <i>Venturia inaequalis</i>	
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	

Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Suchinni <i>Cucurbita</i> sp.	Mildiu vellosa <i>Peronospora</i> sp.	1,5-2,5 kg/ha
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Marchado de grano <i>Fusarium</i> sp., <i>Curvularia</i> sp.	1,5-2,0 kg/ha en 200 l de agua, aplicado al 5-10% de floración.

NOTA:

- Se recomienda la aplicación aérea para el cultivo de banano.
- En el cultivo de banano, aplicar solamente en plantas con fruto embolsado.

INTERVALO DE APLICACIÓN: De 5 a 10 días dependiendo de la incidencia de la enfermedad y de las condiciones climáticas. En banano no realizar más de 80 aplicaciones al año. Para arroz, frijol, ajo, cebolla, melón, sandía y pepino realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo (2 ciclos por año). En café y manzana realizar un máximo de 3 aplicaciones al año. En papa, tomate, chile, berenjena y tabaco realizar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Banano y plátano: 0 días. Resto de Cultivos: 7 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Banano y plátano: 2 horas. Resto de Cultivos: 12 horas. Asegúrese que el caldo de aspersión haya secado completamente.

FITOTOXICIDAD: Antracol 70 WP, no es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las recomendaciones.

COMPATIBILIDAD: Antracol 70 WP se puede mezclar con otros agroquímicos de uso común.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Conservar y transportar Antracol 70 WP, en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No lo almacene ni lo transporte junto a herbicidas, forrajes, alimentos y medicamentos. Almacénelo en un lugar fresco y seco. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre cúbralos con aserrín u otro material orgánico absorbente y luego alimínelo según la legislación y/o normas locales vigentes.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER, DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Debilidad muscular, irritación de los ojos, piel y membranas del tracto respiratorio. En personas susceptibles, suelen ocurrir alergias por sensibilización.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Alejar al paciente del área contaminada hacia un lugar fresco y ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua limpia por 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa y zapatos contaminados y lavar el área afectada con abundante agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: Antracol 70 WP no tiene antídoto. Aplicar tratamiento sintomático. Evitar las bebidas alcohólicas como mínimo 48 horas antes o después de ocurrida la intoxicación.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONOS
Centro de Información y Asesoría Toxicológica	GUATEMALA	(502) 2251-3560
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	(503) 2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 232 2322 (504) 232 2316
Depto. de Toxicología / MINSA	NICARAGUA	(505) 2289-4700 ext. 17 (505) 8755-0983
Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	COSTA RICA	(506) 22231028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	PANAMA	(507) 5234948
Hospital Dr. Moscoso Puello	REP. DOMINICANA	(809) 681-7828
Karl Heusner Memorial Hospital	BELICE	(501) 223-0778
Hosp. Militar Carlos Finlay	CUBA	(537) 2601230 (537) 2608751
Villa Clara		(042) 22-6197 / 22-4770
Ciego de Avila		(033) 49-1572 / 49-1575
Santiago de Cuba		(022) 64-1000 / 64-3864

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

TÓXICO PARA EL GANADO



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE, CUANDO LO VACIE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGREGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

Inutilice las bolsas vacías, perfórelas y elimínelas según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo si no se cumplen con las recomendaciones suministradas por el registrante. Al comprar este producto el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo. EL USO DE ESTE PRODUCTO, DE ACUERDO CON LOS PERÍODOS DE CARENCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN DEL PAÍS DE PRODUCCIÓN. EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN ES DE PLENA RESPONSABILIDAD DEL

USUARIO CONOCER LOS LÍMITES DE TOLERANCIA DE SU MERCADO DE DESTINO, SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE EN CUANTO A LA DECISIÓN DE EXPORTACIÓN.

FORMULADO POR:

Bayer S.A.
km 29,5 Ruta al Pacífico
Amatitlán, Guatemala
Tel.: 6628-7200, 6628-7211

IMPORTADO POR:

Bayer, S.A.
km 29,5 Ruta al Pacífico
Amatitlán, Guatemala
Tels. 6628-7200 / 6628-7211

Bayer, S.A.
Complejo World Trade Center
Torre 1, Nivel 5,
Calle el Mirador entre 87 y 89
Av. Norte, Colonia Escalón
San Salvador
(503) 2277-0700
Rodríguez Km 7,5
Boulevard del Ejército Nacional,
Parque Industrial Regina, Nave 4,
Soyapango, San Salvador, El Salvador
(503) 2277-0701

Bayer, S.A. de C.V.
Boulevard Morazán, Colonia Castaño Sur
Avenida Ramon Ernesto Cruz
Calle Cedro Real Sur Este
Frente a Seguros Crefisa
Tegucigalpa, Honduras.
tels: (504) 269-2100, 240-5100

Big Creek Group of Companies
Banana Enterprises Limited Agro Division
BELARUS
Big Creek Station Creek District
Tel: (51) 323-2106/2003

Crosser Fertilizer & Agrotec Co. Ltd.
Mile 8 Western Highway
P.O. Box 566
Belize City, Belize
Tel: (501) 235410

James Brodie & Co. Ltd.
16 Regent Street
P.O. Box 365
Belize City, Belize
Tel: (501) 2277070

Bayer, S.A.
km 11,5 Carretera a Masaya
Managua, Nicaragua
505-2798311

Bayer, S. A.
Oficentro Plaza Tempo, Edificio A (2do Piso)
Autopista Próspero Fernández,
contiguo al Hospital CIMA Escasú
Tel: 25056300, 41006300
Fax: 25056305, 41006305

Bayer Panamá, S.A.
Complejo Global Business Terminal
Avenida Domingo Díaz
Torre A, 5to piso
El Dorado, Panamá
Tel: 2716100 Fax: 2716106

Bayer, S. A.
Avenida Luperón
Zona Industrial de Herrera
Sto. Domingo, Rep. Dom.
Tel.:1-809-5308086

Bayer, S. A.
Calle 17A, No. 17425 (Casa 69) e/ 174 y 190,
Cubanacán Playa,
Ciudad de La Habana, Cuba
Tel.: (537) 204-1383

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	33-188	23-07-12
EL SALVADOR	33-188	03-02-97
HONDURAS	38-19-II	25-04-14
NICARAGUA	BY-043A-4-96	29-06-11
COSTA RICA	663	27-04-93
PANAMÁ	1322A	08-03-10
R. DOMINICANA	25	21-04-12
BELICE	0067-I	25-01-11

CEA80501633B