

# SAMBA 50 SC

## HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

### COMPOSICIÓN

TERBUTRYN

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	TRIAZINA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Herbicida
CATEGORÍA	Terbutrina: 5

### MODO DE ACCIÓN

**SAMBA® 50 SC** es un herbicida selectivo sistémico que controla numerosas malezas de hoja ancha y gramíneas que invaden los cultivos para los cuales se recomienda. Es absorbido por las hojas y las raíces con translocación acropetálica vía xilema. Cuando **SAMBA® 50** se es aplicado, inhibe la fotosíntesis en el fotosistema II, impidiendo la absorción del CO<sub>2</sub> y la reacción de Hill, en especial durante la fase de germinación y en estadio de plántula. Requiere del agua de lluvia o del riego dentro de los 10 días de la aplicación para ser movido hacia la zona de la raíz de la maleza y ser efectivo.

### CULTIVOS PARA NICARAGUA:

#### USOS

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de azúcar <b>Saccharum officinarum</b>	Pata de gallina <b>Eleusina indica</b> Arrocillo <b>Echinochloa colona</b>	<b>Para caña de azúcar:</b> 2.3 – 4.7 L/ha (1.6 – 3.3 L/mz)	<b>Para caña de azúcar, banano, plátano:</b> En post emergencia temprana de las malezas.
Maíz <b>Zea mays</b>	Zacate de agua <b>Echinochloa crus-galli</b>	<b>Para maíz y sorgo:</b> 2.8 – 5.5L/ha (2.7 – 3.85 L/mz)	<b>Para caña de azúcar:</b> Se puede mezclar de 1 – 2L/ha (0.7 – 1.4L/mz) de 2,4-D y otros herbicidas como triazinas y sulfonilureas a la dosis recomendada.
Sorgo <b>Sorghum vulgare</b>	Bledo <b>Amaranthus sp.</b>	<b>Para frijol:</b> 2.8 – 3.8 L/ha (1.9 – 2.6 L/mz)	<b>Para maíz y sorgo:</b> En pre emergencia y se recomienda aplicar en mezcla con atrazina a la dosis recomendada. Post emergencia dirigida (cuando la maleza tenga no más de 4 hojas)
Frijol <b>Phaseolus vulgaris</b>	Lechosa <b>Euphorbia sp.</b>	<b>Para banano y plátano:</b> 1.0 – 2.0L/ha (0.7 – 1.4L/mz)	
Banano y plátano <b>Musa spp.</b>			

### PRESENTACIONES

20 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.