



¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Infinito® 68,75 SC

FUNGICIDA-CARBAMATO, ACYLPICOLIDE
PROPAMOCARB, FLUOPICOLIDE

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,130 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Infinito 68,75 SC, es una combinación de los principios activos Propamocarb y Fluopicolide. Infinito 68,75 SC, es un fungicida que actúa de forma preventiva y curativa, debido a la característica de sus componentes, ofreciendo una actividad traslaminar con efecto antiesporulante, el producto es redistribuido rápidamente vía xilema.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Utilizar equipo de aspersión manual de espalda, motorizado o aéreo. Verifique que el equipo utilizado esté en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Para aplicar este producto se recomienda utilizar boquillas de CONO.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Vierta la mitad de agua y agregue la dosis recomendada de **Infinito 68,75 SC**, agite la mezcla y complete con agua el resto. Mantenga el agitador funcionando durante las operaciones de llenar, mezclar y rociar. Asegúrese de contar con el equipo necesario para dosificar, mezclar y aplicar el producto. Lavar el equipo al terminar la aplicación: cubetas, medidas Bayer, embudo, paletas de agitación, cepillos, etc. Este equipo deberá estar bien marcado y no debe emplearse para otros usos. Durante la preparación de la mezcla y aplicación de **Infinito 68,75 SC**, utilice el equipo de protección personal siguiente: Botas de hule, mascarilla, anteojos protectores, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



RECOMENDACIONES DE USO: Infinito 68,75 SC, está autorizado para utilizarse en: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

CULTIVOS	ENFERMEDADES
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Mancha foliar gris <i>Septoria</i> spp.
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i>	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>
Sandia <i>Citrullus lanatus</i> Calabazas <i>Cucurbita</i> spp.	Cladosporium <i>Cladosporium cucumerinum</i> Moho felpudo <i>Pseudoperonospora cubensis</i>
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Ojo de sapo <i>Cercospora nicotianae</i> Moho azul <i>Peronospora tabacina</i> Pata negra <i>Phytophthora palmivora</i>
Repollo <i>Brassica oleracea</i> var <i>capitata</i>	Alternaria <i>Alternaria brassicae</i> Moho felpudo <i>Peronospora brassicae</i>
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Moho felpudo <i>Peronospora destructor</i>
Lechuga <i>Lactuca sativa</i>	Moho felpudo <i>Bremia lactucae</i>

CULTIVOS	ENFERMEDADES
Hule <i>Hevea brasiliensis</i>	Raya negra <i>Phytophthora</i> sp.
Uva <i>Vitis vinifera</i>	Mancha roja <i>Pseudopeziza tracheiphila</i> Antracnosis <i>Elsinoe ampelina</i> Mancha negra <i>Guignardia bidwellii</i> Moho felpudo <i>Plasmopara viticola</i>
Cítricos <i>Citrus</i> spp.	<i>Phytophthora</i> spp. En drench húmedo durante la producción de plantas jóvenes y en el campo. Aplicar cerca de las raíces.
Chile <i>Capsicum annuum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria</i> sp. Tizón tardío <i>Phytophthora capsici</i>
Ornamentales	Moho felpudo <i>Peronospora</i> sp. Antes de hacer tratamiento general, hacer pruebas previas.

DOSIS RECOMENDADAS:

- **Para hule:** 50 ml / galón de agua. También puede mezclarse con Nativo 75 WG: 8 gr/galón de agua, para control de *Ceratocystis fimbriata*.
- **Resto de cultivos:** 1.5 l/ha. (1 l/mz.) Aplicar de 2,0 - 2,5 medidas Bayer por rociadora de 16 litros. 3-4 cc / l agua.

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	1,0 - 1,5 l/ha.	Etapa vegetativa

INTERVALO DE APLICACIÓN: Cada 7 días, debe rotarse en un máximo de 4-6 aplicaciones por ciclo de cultivo, intercalado con otros productos de diferentes modos de acción.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Papa y melón: 7 días. Tomate y curbitáceas en campo: 3 días. Tomate y pepino en invernadero: 1 día. Resto de cultivos: 14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 12 horas.

FITOTOXICIDAD: Infinito 68,75 SC, no es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las recomendaciones.

Medidas panfleto: 190mm largo x 130mm alto

COMPATIBILIDAD: Infinito 68,7 SC, es compatible con plaguicidas de uso común. Antes de usar es recomendable realizar pruebas de miscibilidad y fitocompatibilidad. No se recomienda mezclar con reguladores de crecimiento. En caso de realizar mezclas con benzimidazoles, se recomienda agregar primero Infinito 68,75 SC y luego el otro fungicida disuuelto previamente. Al agregar se debe agitar la mezcla.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Conserve y transporte el Infinito 68,75 SC en su envase original bien etiquetado y cerrado herméticamente. No lo transporte junto a herbicidas, forrajes, alimentos y medicamentos. Almacénelo en lugar fresco y seco. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralo con un material orgánico absorbente como aserrín y luego elimínelo según la legislación y las normas locales vigentes.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER, DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: No se han observado síntomas de intoxicación, sin embargo, puede presentarse síntomas como dolor de cabeza, sudor excesivo, náuseas y dificultad en la respiración.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Alejar al paciente del área contaminada hacia un lugar fresco y ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua limpia por 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa y zapatos contaminados y lavar la área afectada con abundante agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: Infinito 68,75 SC, no tiene antidoto. Aplicar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONOS
Centro de Información y Asesoría Toxicológica	GUATEMALA	(502) 22320735
Centro Nacional de Información Toxicológica	EL SALVADOR	(503) 2525-5800 ext.148/149
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 232 2322 (504) 232 2316
Depto. de Toxicología / MINSA	NICARAGUA	(505) 289 7150
Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	COSTA RICA	(506) 22231028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	PANAMA	(507) 5234948
Hospital Dr. Luis Aybar	REP. DOMINICANA	(809) 684 3478
Hospital Dr. Moscoso Puello		(809) 681-2913
Karl Heusner Memorial Hospital	BELICE	(501) 2 30778

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE, CUANDO LO VACIE LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGREGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usuario.

Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo. **EL USO DE ESTE PRODUCTO, DE ACUERDO A LOS PERÍODOS DE CARENCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN RECOMENDADOS EN ESTE PANFLETO Y CON APEGO A LAS NORMAS LEGALES DEL PAÍS PRODUCTOR Y DEL PAÍS IMPORTADOR, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE LAS PUBLICACIONES RESPECTIVAS O AL TÉCNICO EN LA MATERIA.**

FORMULADO POR:

Bayer CropScience S.A.
14,20 rue Pierre Baizet F-69009
Lyon, Francia

IMPORTADO POR:

Bayer S.A.
km 29.5 Ruta al Pacifico
Amatitlán, Guatemala
Tels. 6628-7200 / 6628-7211

Bayer S.A.
km 11,5 Carretera a Masaya
Managua, Nicaragua
505-2798311

Bayer S.A.
Calle El Progreso No. 2748
Col. Flor Blanca. Apdo. Postal 494
San Salvador, El Salvador
(503) 22679000 / 22782000

Bayer S.A.
Eurocenter II, 5to piso
400mts al Este del Centro
Comercial Real Canari,
Barreal de Heredia, Costa Rica
506-2589-8900, 2589-8600

Bayer, S.A. de C.V.
Boulevard Morazán, Colonia Castaño Sur
Avenida Ramon Ernesto Cruz
Calle Cedro Real Sur Este
Frente a Seguros Creffisa
Tegucigalpa, Honduras.
Tels: (504) 269-2100, 240-5100

Bayer Panamá S.A.
Parque Industrial de Costa del Este
Calle 1ra. Edif. No. 95
Corregimiento de Parque Lefevre
Ciudad Panamá
Tel. 00507 4412640

Prosser Fertilizer & Agrotec Co. Ltd.
Mile 8 Western Highway
P.O. Box 566
Belize City, Belize
Tel: (501) 235410

Bayer S.A.
Avenida Luperón
Zona Industrial de Herrera
Sto. Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 1-809-5308086

James Brodie & Co. Ltd.
16 Regent Street
P.O. Box 365
Belize City, Belize
Tel: (501) 2277070

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	33-627B	15-12-06
EL SALVADOR		
HONDURAS	367-195-II	15-03-06
NICARAGUA		
COSTA RICA	8702368	23-03-10
PANAMA		
REP. DOMINICANA	2674	17-01-07

Medidas panfleto: 190mm largo x 130mm alto